

アクチビア®軟膏 購入前チェックシート

購入する前に、必ずチェックしてください。

効能：口唇ヘルペスの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）

**1. 次の項目がひとつでも「はい」に該当する場合は
医師の治療を受けてください。**

- | | はい | いいえ |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ● こういう症状が初めてですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 患部が広範囲ですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 水疱（水ぶくれ）が
大きい（小豆大）ですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 頭痛がありますか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 疼痛がひどいですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 本剤、本剤の成分又は
バラシクロビル塩酸塩製剤により
アレルギー症状を起こした
ことがありますか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 使用者は6歳未満の乳幼児ですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 患部がくちびるとそのまわりを
のぞく部位ですか？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. 1の項目が全て「いいえ」の場合、

このチェックシートの説明や製品に記載された
事項をよくお読みになり、購入してください。

☆ご不明な点がございましたら、薬剤師に相談してください。

アクチビア®軟膏を使用する前に

次の人、及び次の部位には、本剤を使用しないでください。

（守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります）

- 初めて発症したと思われる人、患部が広範囲の人
- 本剤、本剤の成分又はバラシクロビル塩酸塩製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 6歳未満の乳幼児 ● 目や目の周囲
- 唇とそのまわりをのぞく部位

次の項目に該当する場合は医師又は薬剤師に相談してください。

- 医師の治療を受けている人
- 妊婦又は妊娠していると思われる人 ● 授乳中の人
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 湿潤やただれがひどい人 ● アトピー性皮膚炎の人

アクチビア®軟膏を使用中に

次の場合は、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

1. 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感、疼痛、乾燥、灼熱感、落屑（フケ、アカのような皮膚のはがれ）、じんましん

2. 5日間位使用しても症状がよくならない場合、
又はひどくなる場合

製造販売元：グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6番15号

製品・口唇ヘルペスに関する情報は <http://activir.jp>